

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CURSO DE POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA

**CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICA DE LOS
FACTORES LIMITANTES PARA LA REALIZACIÓN DEL
EXAMEN DE PAPANICOLAU, DE LAS MUJERES DE LA USF
15 DE AGOSTO, DISTRITO DE LIMPIO ENERO – FEBRERO**

2022

LILIANA ELIZABETH ALEN BARRIOS

Tutores: Dra. Antonieta Rojas de Arias

Dra. Gloria Celeste Aguilar Barreto

Asunción – Paraguay

2022

RESUMEN

El cáncer cérvico uterino representa la primera causa de muerte en mujeres en Paraguay, es prevenible y tratable si se detecta a tiempo.(1) Esto se consigue a través del estudio regular de Papanicolau (PAP) que forma parte de la prevención secundaria y se basa en la identificación citológica de alteraciones celulares y sus precursores en los tejidos del cuello uterino.(2) En Paraguay la cobertura de realización del examen de Papanicolau en las mujeres es del 20%, lo que coloca al sistema de salud ante el gran desafío de aumentarla.(3)

La prevención primaria del cáncer cérvico uterino, consiste en la vacunación en la infancia contra el Virus Papiloma Humano (VPH) responsable de las lesiones precursoras y es parte Programa Ampliado de Inmunización (PAI) desde el año 2002.(4)

De allí la importancia de la vacunación en las niñas de 9 años a 14 años ya que la vacuna proporciona protección en un 98 y 100 % contra las lesiones que producen el cáncer de cuello uterino.(5)

Objetivo: Determinar el Conocimiento, Actitud y Práctica de los factores limitantes en la realización del examen de Papanicolau, de las Mujeres de la USF 15 de Agosto del distrito de Limpio.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal.

Resultados: Se demostró que hay un conocimiento alto en relación a que conoce en que consiste el examen de Papanicolau, y que el objetivo de la realización del estudio es la detección temprana de las lesiones pre cancerígenas.

En cuanto a su actitud frente a la realización del examen de Papanicolau es un factor limitante para la realización del estudio ya que el 69% de las encuestadas refirió sentir vergüenza y el temor es una de las barreras que conlleva la no realización periódica del PAP.

En relación a la Práctica para la realización del examen ginecológico en forma anual, el 71% de las mujeres encuestadas confirma que no han realizado el PAP por falta de tiempo, desinterés o no desea esperar mucho tiempo para la consulta, en cuanto a la frecuencia con que se realiza el PAP el estudio evidencia que el 41% no cumple con el periodo recomendado o necesario para detección temprana y el tratamiento oportuno.

Conclusión: En conclusión, revelo que el nivel de conocimiento es elevado, pero no guarda relación con la práctica en la realización del PAP de las mujeres que formaron parte del estudio, la investigación entre otros puntos se evidencio que la actitud es un factor determinante de limitación para la realización del examen del PAP.

Palabras Claves: Papanicolau; Conocimiento; Actitud; Práctica; Cáncer de cuello uterino.